

**Zāļu vispārīgie nosaukumi, kas paredzēti diagnožu grupas
"5. Audzēji" ārstēšanai**

Diagnozes grupa/ diagnoze	Diagnozes kods (SSK-10)	Komp. apmērs %	Zāļu vispārīgie nosaukumi/ medicīnas ierīces	Kompensācijas nosacījumi
1	2	3	4	5
5.1. Lūpas, mutes dobuma un rīkles ļaundabīgi audzēji				
5.1.1. Lūpas ļaundabīgi audzēji	C00.0-C00.6, C00.8, C00.9	100	Dexamethasonum Prednisolonum	
5.1.2. Mēles saknes ļaundabīgs audzējs	C01	100	Metoclopramidum Etamsylatum Spironolactonum	
5.1.3. Citu un neprecizētu mutes daļu ļaundabīgs audzējs	C02.0-C02.4, C02.8, C02.9	100	Diazepamum Carbamazepinum	
5.1.4. Smaganu ļaundabīgs audzējs	C03.0, C03.1, C03.9	100	Amitriptylinum Furosemidum	
5.1.5. Mutes pamatnes ļaundabīgs audzējs	C04.0, C04.1, C04.8, C04.9	100	Tramadolum Metronidazolom	
5.1.6. Aukslēju ļaundabīgs audzējs	C05.0-C05.2, C05.8, C05.9	100	Diclofenacum Trimeperidinum Morphinum	
5.1.7. Citu un neprecizētu mutes daļu ļaundabīgs audzējs	C06.0-C06.2, C06.8, C06.9	100	Dihydrocodeinum	
5.1.8. Pieauss dziedzera ļaundabīgs audzējs	C07	100	Fentanylum Oxycodonum	Tikai pacientiem ar <i>Morphinum</i> nepanesību.
5.1.9. Citu un neprecizētu lielo siekalu dziedzeru ļaundabīgs audzējs	C08.0, C08.1, C08.8, C08.9	100	Tamoxifenum	Onkologa kompetencē
5.1.10. Mandeles ļaundabīgs audzējs	C09.0, C09.1, C09.8, C09.9	100	Cyproteronum Flutamidum	C61: izraksta urologs vai onkologs-ķīmijterapeits, vai ģimenes ārsts (tikai pēc urologu-ķīmijterapiju konsīlija slēdziena un atbilstoši urologa rekomendācijām).
5.1.11. Rīkles mutes daļas ļaundabīgs audzējs	C10.0-C10.4, C10.8, C10.9	100	Polyestradioli phosphatum/ Mepivacainum/ Nicotinamidum Triptorelinum	
5.1.12. Aizdegunes (<i>nasopharinx</i>) ļaundabīgs audzējs	C11.0-C11.3, C11.8, C11.9	100		
5.1.13. Bumbierveida dobuma (<i>sinus/recessus pyriformis</i>) ļaundabīgs audzējs	C12	100	Bicalutamidum	C61: izraksta urologs vai onkologs-ķīmijterapeits, vai ģimenes ārsts (tikai pēc urologu-ķīmijterapiju konsīlija slēdziena un atbilstoši urologa rekomendācijām): 1) 50 mg- tikai pacientiem ar <i>Flutamidum</i> nepanesību, 2) 150 mg- tikai adjuvantā terapijā augsta riska pacientiem ar lokāli izplatītu prostatas vēzi.
5.1.14. Rīkles apakšējās daļas (hypopharynx) ļaundabīgs audzējs	C13.0-C13.2, C13.8; C13.9	100		
5.1.15. Lūpas, mutes dobuma un rīkles ļaundabīgi audzēji ar citu un neprecizētu lokalizāciju	C14.0, C14.2, C14.8	100		
5.2. Gremošanas orgānu ļaundabīgi audzēji				

1	2	3	4	5	
5.2.1. Barības vada ļaundabīgs audzējs	C15.0-C15.5, C15.8, C15.9	100	Goserelinum	Krūts vēža (C50) ārstēšanai izraksta onkologs - ķīmijterapeits. C61: izraksta urologs vai onkologs-ķīmijterapeits, vai ģimenes ārsts (tikai pēc urologu-ķīmijterapeitu konsīlija slēdziena un atbilstoši urologa rekomendācijām).	
5.2.2. Kuņģa ļaundabīgs audzējs	C16.0-C16.6, C16.8, C16.9	100			
5.2.3. Tievās zarnas ļaundabīgs audzējs	C17.0-C17.3, C17.8, C17.9	100			
5.2.4. Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs	C18.0-C18.9	100			
5.2.5. Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs	C19	100	Anastrozolum Letrozolum Exemestanum		
5.2.6. Taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs	C20	100			
5.2.7. Tūpļa (<i>anus</i>) un tūpļa kanāla (<i>canalis analis</i>) ļaundabīgs audzējs	C21.0-C21.2, C21.8	100			
5.2.8. Aknu un intrahepatisko žultsvadu ļaundabīgs audzējs	C22.0-C22.4, C22.7, C22.9	100			
5.2.9. Žultspūšļa ļaundabīgs audzējs	C23	100			
5.2.10. Citu un neprecizētu žultsceļu daļu ļaundabīgs audzējs	C24.0, C24.1, C24.8, C24.9	100	Medroxyprogesteronum		
5.2.11. Aizkuņģa dziedzerā ļaundabīgs audzējs	C25.0-C25.4, C25.7-C25.9	100	Megestrolum	Izraksta onkologs-ķīmijterapeits.	
5.2.12. Ļaundabīgs audzējs pārējos un neprecīzi definētos gremošanas orgānos	C26.0, C26.1, C26.8, C26.9	100	Chlorambucilum	Izraksta hematologs vai onkologs-ķīmijterapeits: C81, C82, C83, C84, C85, C91.1, C91.9.	
5.3. Elpošanas sistēmas un krūšu dobuma orgānu ļaundabīgi audzēji			Melphalanum	Izraksta hematologs vai onkologs-ķīmijterapeits: C88.0, C90.0, C90.1, C90.2.	
5.3.1. Deguna dobuma un vidusauss ļaundabīgi audzēji	C30.0, C30.1	100	Temozolomidum	Izraksta onkologs-ķīmijterapeits ļaundabīgas gliomas un anaplastiskas astrocitomas ārstēšanai pacientiem, kuriem: 1) vecums 16-65 gadi; 2) vispārējais stāvoklis pēc Karnofska > 70 ballēm, paredzamā dzīvildze > 6 mēneši; 3) ķirurģiskās evakuācijas apjoms >60%; 4) nav citu smagu vai dzīvību apdraudošu saslimšanu; 5) klīniski-bioķīmiskie rādītāji ļauj uzsākt un turpināt sistemātisku ķīmijterapiju atbilstoši zāļu aprakstam un neiroonkoloģijas pamatprincipiem.	
5.3.2. Deguna blakusdobumu ļaundabīgi audzēji	C31.0-C31.3, C31.8, C31.9	100			
5.3.3. Balsenes ļaundabīgs audzējs	C32.0-C32.3, C32.8, C32.9	100			
5.3.4. Trahejas ļaundabīgs audzējs	C33	100			
5.3.5. Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs	C34.0-C34.3, C34.8, C34.9	100			
5.3.6. Aizkrūtes dziedzerā (<i>thymus</i>) ļaundabīgs audzējs	C37	100			
5.3.7. Sirds, videnes un pleiras ļaundabīgi audzēji	C38.0-C38.4, C38.8	100			
5.3.8. Citas un neprecizētas lokalizācijas elpošanas sistēmas un krūšu dobuma orgānu ļaundabīgi audzēji	C39.0, C39.8, C39.9	100			
5.4. Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgs audzējs			Carboplatinum		Izraksta onkologs-ķīmijterapeits: C56, C34.

1	2	3	4	5
5.4.1. Ekstremitāšu kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji	C40.0-C40.3, C40.8, C40.9	100	Fluoruracilum	Izraksta onkologs-ķīmijterapeits.
5.4.2. Citas un neprecizētas lokalizācijas kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji	C41.0-C41.4, C41.8, C41.9	100	Vincristinum Vinblastinum	Izraksta onkologs-ķīmijterapeits vai hematologs.
5.5. Melanoma un citi ļaundabīgi ādas audzēji			Methotrexatum	Izraksta hematologs vai onkologs-ķīmijterapeits: C50, C91.0, C92.0, C92.5, C93.0, C94.0, C94.2.
5.5.1. Ļaundabīga ādas melanoma	C43.0-C43.9	100		
5.5.2. Citi ļaundabīgi ādas audzēji	C44.0-C44.9	100	Mercaptopurinum	Izraksta hematologs: C91.0, C92.0, C92.5, C93.0, C94.0, C94.2, D46, D47.1.
5.6. Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji			Tioguaninum	Izraksta hematologs: C90, C91.0, C92.5, C93, C94.0, C94.2, D46, D47.1.
5.6.1. Mezotelioma	C45.0-C45.2, C45.7, C45.9	100		
5.6.2. Kapoši sarkoma	C46.0-C46.3, C46.7-C46.9	100		
5.6.3. Perifērisko nervu un veģetatīvās (autonomās) nervu sistēmas ļaundabīgi audzēji	C47.0-C47.6, C47.8, C47.9	100	Fludarabinum	Izraksta hematologs: C91.1 pacientiem, kuriem nav bijusi atbildes reakcija uz terapiju vai kuriem slimība progresējusi, lietojot terapijas shēmu, kurā iekļauts vismaz viens standarta alkilējošs līdzeklis.
5.6.4. Retroperitoneālo audu un vēderplēves ļaundabīgs audzējs	C48.0-C48.2, C48.8	100		
5.6.5. Pārējo saistaudu un mīksto audu ļaundabīgi audzēji	C49.0-C49.6, C49.8, C49.9	100		
5.7. Krūts ļaundabīgs audzējs			Tegafurum	Izraksta onkologs-ķīmijterapeits.
5.7.1 Krūts ļaundabīgs audzējs	C50.0-C50.6, C50.8, C50.9	100		
5.8. Sieviešu dzimumorgānu ļaundabīgi audzēji			Capecitabinum	Izraksta onkologs-ķīmijterapeits: 1) kombinācijā ar <i>Docetaxelum</i> lokalizēta progresējoša vai metastātiska krūts vēža (C50) ārstēšanai pēc neveiksmīgas ķīmijterapijas, 2) monoterapijā lokalizēta progresējoša vai metastātiska krūts vēža (C50) ārstēšanai pēc neveiksmīgas ķīmijterapijas ar taksāniem un antraciklīnus saturošām shēmām, vai pacientiem, kuriem nav indicēta turpmāka antraciklīnu terapija, 3) adjuvantā terapijā pēc 3. pakāpes (C pakāpe pēc Duke's) resnās zarnas vēža operācijas (C18.0- C18.9).
5.8.1. Ārējo dzimumorgānu (<i>vulva</i>) ļaundabīgi audzēji	C51.0-C51.2, C51.8, C51.9	100		
5.8.2. Maksts ļaundabīgs audzējs	C52	100		
5.8.3. Dzemdes kakla ļaundabīgs audzējs	C53.0, C53.1, C53.8, C53.9	100		
5.8.4. Dzemdes ķermeņa ļaundabīgs audzējs	C54.0-C54.3, C54.8, C54.9	100		
5.8.5. Neprecizētu dzemdes daļu ļaundabīgs audzējs	C55	100		
5.8.6. Olnīcu ļaundabīgs audzējs	C56	100		
5.8.7. Citu un neprecizētu sieviešu dzimumorgānu daļu ļaundabīgs audzējs	C57.0-C57.4, C57.7-C57.9	100		
5.8.8. Placentas ļaundabīgs audzējs	C58	100		
5.9. Vīriešu dzimumorgānu ļaundabīgi audzēji			Etoposidum	Izraksta onkologs-ķīmijterapeits vai hematologs: C56, C81, C82,

1	2	3	4	5
5.9.1. Dzimumlocekļa ļaundabīgs audzējs	C60.0-C60.2, C60.8, C60.9	100		C83, C84, C85, C92.7, C93.1, D46.
5.9.2. Prostatas ļaundabīgs audzējs	C61	100	Hydroxycarbamidum	Izraksta hematologs: C92.0-C92.5, C92.7, C93.1, C94.1, D46, D47.1, D47.3 rezistentu formu ārstēšanai.
5.9.3. Sēklinieka ļaundabīgs audzējs	C62.0, C62.1, C62.9	100		
5.9.4. Citu un neprecizētu vīriešu dzimumorgānu daļu ļaundabīgs audzējs	C63.0-C63.2, C63.7-C63.9	100	Erythropoietinum Darbepoietinum alfa	Izraksta hematologs vai onkologs-ķīmijterapeits: 1) C56, C81, C90.0 pacientiem, kuri saņem pretaudzēju terapiju un, ja Hb<100 g/l un Feritīns>100ng/ml, 2) C82, C83, C84, C85, C91 pacientiem, kuri saņem pretaudzēju terapiju un, ja Hb<100 g/l un Feritīns>100ng/ml, Kumbsa reakcija negatīva.
5.10. Urīnizvadorgānu ļaundabīgs audzējs				
5.10.1. Nieres ļaundabīgs audzējs, izņemot nieres bļodiņu	C64	100		
5.10.2. Nieres bļodiņas ļaundabīgs audzējs	C65	100		
5.10.3. Urīnvada ļaundabīgs audzējs	C66	100		
5.10.4. Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs	C67.0-C67.9	100	Calcitriolum	Izraksta hematologs: C92.7, C92.9, C93.0, C93.1, D46.
5.10.5. Citu un neprecizētu urīnizvadorgānu daļu ļaundabīgs audzējs	C68.0, C68.1, C68.8, C68.9	100	Interferonum alfa	Izraksta onkologs-ķīmijterapeits vai hematologs: C43, C64, C65, C82, C83, C84, C85, C90.0, C91.1, C91.4, C92.0 - C92.5, C92.7, C94.1, D47.1, D47.3.
5.11. Acs, smadzeņu un citu CNS daļu ļaundabīgs audzējs				
5.11.1. Acs un acs palīgorgānu ļaundabīgs audzējs	C69.0-C69.6, C69.8, C69.9	100	Ciclosporinum	Izraksta hematologs: C91.0, C92.0, C92.4, C92.5, C93.0, C94.0, C94.2.
5.11.2. Smadzeņu apvalku ļaundabīgs audzējs	C70.0, C70.1, C70.9	100		
5.11.3. Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs	C71.0-71.9	100	Calcii folinatum	Izraksta onkologs-ķīmijterapeits.
5.11.4. Muguras smadzeņu, kraniālo nervu un citu centrālās nervu sistēmas daļu ļaundabīgi audzēji	C72.0-C72.5, C72.8, C72.9	100	Ondansetronum Granisetronum	Izraksta onkologs-ķīmijterapeits vai hematologs pacientiem, kuri saņem augsta emetogēna riska ķīmijterapiju akūtas vemšanas profilaksei.
5.12. Vairogdziedzera un citu endokrīno dziedzeru ļaundabīgi audzēji				
5.12.1. Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs	C73	100	Filgrastimum Pegfilgrastimum	Izraksta onkologs-ķīmijterapeits vai hematologs pacientiem ar onkoloģiskām un hematoloģiskām slimībām (izņemot mieloīdas malignitātes), kuri saņem ķīmijterapiju, ja: 1) neitrofilo leukocītu absolūtais skaits < 0,5 x10 ⁹ /L (III-IV pakāpes neitropēnija); 2) profilaktiski, ja iepriekšējos ķīmijterapijasursos bijusi III-IV pakāpes neitropēnija, febrila neitropēnija un neitrofilo leukocītu absolūtais skaits <1,0x10 ⁹ /L.
5.12.2. Virsnieru ļaundabīgs audzējs	C74.0, C74.1, C74.9	100		
5.12.3. Pārējo endokrīno dziedzeru un radniecīgu struktūru ļaundabīgi audzēji	C75.0-C75.5, C75.8, C75.9	100		
5.13. Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji				

1	2	3	4	5	
5.13.1. Citas un neprecīzi apzīmētas lokalizācijas ļaundabīgi audzēji	C76.0-C76.5, C76.7, C76.8	100			
5.13.2. Sekundārs un neprecizēts limfmezglu ļaundabīgs audzējs	C77.0-C77.5, C77.8, C77.9	100	Rituximabum	Izraksta onkologs-ķīmijterapeits vai hematologs pēc konsilija slēdziena, ja vispārējais stāvoklis pēc Karnofska > 70 balles, paredzamā dzīvildze > 6 mēneši: 1) CD20 pozitīva difūza liela B šūnu ne- Hodžkina limfoma (C83) kombinācijā ar CHOP (<i>Cyclophosphamidum</i> , <i>Doxorubicinum</i> , <i>Vincristinum</i> , <i>Prednisolonum</i>), 2) ne- Hodžkina folikulāras limfomas (C82) III-IV stadija- iepriekš neārstētiem pacientiem kombinācijā ar CVP (<i>Cyclophosphamidum</i> , <i>Vincristinum</i> , <i>Prednisolonum</i>).	
5.13.3. Sekundārs elpošanas un gremošanas orgānu ļaundabīgs audzējs	C78.0-C78.8	100			
5.13.4. Sekundārs citas lokalizācijas ļaundabīgs audzējs	C79.0-C79.8	100			
5.13.5. Ļaundabīgs audzējs bez norādes par lokalizāciju	C80	100			
5.14. Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji					
5.14.1. Hodžkina slimība	C81.0-C81.3, C81.7, C81.9	100			
5.14.2. Folikulāra (nodulāra) ne Hodžkina limfoma	C82.0-C82.2, C82.7, C82.9	100			
5.14.3. Difūza, ne Hodžkina limfoma	C83.0-C83.9	100			
5.14.4. Perifērisko un ādas T šūnu limfomas	C84.0-C84.5	100	Imatinibum	Izraksta hematologs pēc hematologu konsilija slēdziena: 1) pieaugušiem Ph+ HML (C92.1) hroniskā fāzē: - pacientiem, kuri ir intoleranti pret <i>Interferonum alfa</i> terapiju vai tā ir neefektīva, - pacientiem, kuriem terapija ar <i>Hydroxycarbamidum</i> ir neefektīva; 2) bērniem: - Ph+ HML (C92.1) hroniskā fāzē: pacientiem, kuri ir intoleranti pret <i>Interferonum alfa</i> terapiju vai tā ir neefektīva, - Ph+ HML (C92.1) akcelerācijas fāzē, ja hroniskā fāzē nav saņemta <i>Imatinibum</i> terapija.	
5.14.5. Citi un neprecizēti, ne Hodžkina limfomas veidi	C85.0, C85.1, C85.7, C85.9	100			
5.14.6. Ļaundabīgas imūnproliferatīvas slimības	C88.0-C88.3, C88.7, C88.9	100			
5.14.7. Multiplā mieloma un ļaundabīgi plazmas šūnu audzēji	C90.0-C90.2	100			
5.14.8. Limfoleikoze	C91.0-C91.5, C91.7, C91.9	100			
5.14.9. Mieloleikoze	C92.0-C92.5, C92.7, C92.9	100			
5.14.10. Monocitāra leikoze	C93.0-C93.2, C93.7, C93.9	100			
5.14.11. Citas precizētas leikozes	C94.0-C94.5, C94.7	100			
5.14.12. Neprecizētu šūnu leikoze	C95.0-C95.2, C95.7, C95.9	100			
5.14.13. Citi un neprecizēti limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji	C96.0-C96.3, C96.7, C96.9	100	Topotecanum		
5.15. Neatkarīgi (primāri) multipli ļaundabīgi audzēji					Izraksta onkologs- ķīmijterapeits pēc konsilija slēdziena: metastātiska olnīcu vēža (C56) 2.līnijas ķīmijterapijai (monoterapijā), ja vispārējais stāvoklis pēc Karnofska > 70 balles, paredzamā dzīvildze > 6 mēneši un, ja: 1) nav atbildes reakcijas uz
5.15.1. Neatkarīgi (primāri) multipli ļaundabīgi audzēji	C97	100			

1	2	3	4	5
5.16. Neskaidras vai nezināmas dabas audzēji				sākotnēju platīna standartterapiju kombinācijā ar <i>Paclitaxelum</i> , 2) ja slimība progresē 6 mēnešu laikā pēc platīna un <i>Paclitaxelum</i> kombinētās terapijas kursa pabeigšanas, 3) pacientēm ar alerģiju pret platīna grupas preparātiem.
5.16.1. Mutes dobuma un gremošanas orgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu	D37.0-D37.7, D37.9	100		
5.16.2. Vidusauss, elpošanas un krūšu kurvja orgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu	D38.0-D38.6	100		
5.16.3. Sieviešu dzimumorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu	D39.0-D39.2, D39.7, D39.9	100	Gemcitabinum	Izraksta onkologs- ķīmijterapeits pēc konsīlija slēdziena, ja vispārējais stāvoklis pēc Karnofska > 70 balles, paredzamā dzīvildze > 6 mēneši: lokāli progresējošs vai metastātisks nesīkšūnu plaušu vēzis (C34).
5.16.4. Vīriešu dzimumorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu	D40.0, D40.1, D40.7, D40.9	100		
5.16.5. Urīnizvadorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu	D41.0-D41.4, D41.7, D41.9	100		
5.16.6. Smadzeņu apvalku audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu	D42.0, D42.1, D42.9	100	Irinotecanum Oxaliplatinum	Izraksta onkologs- ķīmijterapeits pēc konsīlija slēdziena, ja vispārējais stāvoklis pēc Karnofska > 70 balles, paredzamā dzīvildze > 6 mēneši, nav CNS metastāzes, ir neizmainītas bioķīmiskās analīzes, metastāzes lokalizētas ne vairāk kā 2 vietās- 1. līnijas ķīmijterapijā pacientiem ar metastātisku kolorektālu vēzi (C18-C20) kombinācijā ar 5-FU/LV.
5.16.7. Smadzeņu un centrālās nervu sistēmas audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu	D43.0-D43.4, D43.7, D43.9	100		
5.16.8. Endokrīno dziedzeru audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu	D44.0-D44.9	100		
5.16.9. Īstā policitēmija (<i>polycythaemia vera</i>)	D45	100		
5.16.10. Mieloplastiskie sindromi	D46.0-D46.4, D46.7, D46.9	100		
5.16.11. Pārējie limfādu, asinsrades un radniecīgu audu audzēji ar neskaidru vai nezināmu dabu	D47.0-D47.3, D47.7, D47.9	100		
5.16.12. Citas un neprecizētas lokalizācijas audzēji ar neskaidru vai nezināmu dabu	D48.0-D48.7, D48.9	100		

Zāļu cenu valsts aģentūras direktore

D. Behmane