

**Zāļu vispārīgie nosaukumi/ medicīnas ierīces, kas paredzēti diagnožu grupas
"15. Psihiski un uzvedības traucējumi" ārstēšanai**

N.p.k.	Diagnozes grupa/ diagnoze	Diagnozes kods (SSK-10)	Komp. apmērs %	Zāļu vispārīgie nosaukumi/ medicīnas ierīces	Kompensācijas nosacījumi
1	2	3	4	5	6
1.	Alcheimera demence	F00.0-F00.2 F00.9	75	Chlorprothixenum Flupentixolum	F06.0, F06.2 psihiatra kompetencē
	Demence citur klasificētu slimību dēļ	F02.0 F02.2 F02.8	75	Melperonum Haloperidolum Ac. valproicum Ac. valproicum/	
	Citi psihiski traucējumi, kas rodas smadzeņu bojājumu un disfunkcijas vai somatiskas slimības dēļ	F06.0 F06.2	75	Natrii valproatum Carbamazepinum Clomipraminum Amitriptylinum Nortriptylinum Fluoxetinum Diazepamum Fenazepamum Clonazepamum Nitrazepamum Alprazolamum Trihexyphenidylum	
2.	Šizofrēnija	F20.0-F20.6 F20.8	100	Chlorprothixenum Levomepromazinum Flupentixolum	
	Šizotipiski traucējumi	F21	75	Melperonum Haloperidolum	
	Persistējoši murgi	F22.0 F22.8 F22.9	75	Sulpiridum Zuclopenthixolum	Tikai pacientiem, kuriem: 1) kontraindicēta tipisko neiroleptisko līdzekļu lietošana, 2) tikai pret citiem neiroleptiskiem līdzekļiem rezistentas šizofrēnijas gadījumā.
	Šizoafektīvi traucējumi	F25.0- F25.2 F25.8 F25.9	75	Clozapinum	
	Bipolāri afektīvi	F31.0- F31.9	75	Sertindolum	Tikai pacientiem, kuri jau uzsākuši <i>sertindolum</i> lietošanu un citi neiroleptiski līdzekļi ir nepiemēroti.
				Amisulpridum Olanzapinum Quetiapinum Risperidonum	Tikai pacientiem, kuriem: 1) kontraindicēta vai bipolāri afektīvu traucējumu gadījumā nav piemērota tipisko neiroleptisko līdzekļu lietošana, 2) šizofrēnijas uzliesmojumi vai postprocesuālais periods norit ar depresijas simptomātiku, 3) tipisko neiroleptiķu lietošana izsauc ekstrapiramidālas blakusparādības.

1	2	3	4	5	6
				Ziprasidonum Aripiprazolum	Tikai pacientiem ar paaugstinātu ķermeņa masu vai dislipidēmiju, vai glikozes metabolisma traucējumiem, kuriem: 1) kontraindicēta tipisko neiroleptisko līdzekļu lietošana; 2) šizofrēnijas uzliesmojumi vai postprocesuālais periods norit ar depresijas simptomātiku; 3) tipisko neiroleptiķu lietošana izsauc ekstrapiramidālas blakusparādības.
				Imipraminum Clomipraminum Amitriptylinum Nortriptylinum Fluoxetinum Citalopramum Paroxetinum Sertralinum Fluvoxaminum Escitalopramum Tianeptinum	
				Venlafaxinum Mirtazapinum Bupropionum	Rezistentas depresijas gadījumā, ja 3 iepriekšējie ārstēšanas kursi ar citiem antidepresantiem ir bijuši neveiksmīgi.
				Diazepamum Buspironum Nitrazepamum Fenazepamum Clonazepamum Alprazolamum Carbamazepinum Ac. valproicum Ac. valproicum/ Natrii valproatum Trihexyphenidylum	
				Lamotriginum	Tikai pie F31.0-F31.9
3.	Rekurenti depresīvi traucējumi	F33.0- F33.4 F33.8 F33.9	75	Imipraminum Clomipraminum Amitriptylinum Nortriptylinum Fluoxetinum Citalopramum Paroxetinum Fluvoxaminum Escitalopramum Sertralinum Tianeptinum	F33 diagnozes uzstādīšana un terapijas noteikšana psihiatra kompetencē. Zāļu iegāde tiek kompensēta tikai tad, ja pēc 6 mēnešu depresijas terapijas nav sasniegta remisija.
			2	Venlafaxinum Bupropionum Mirtazapinum Milnacipranum	Tikai rezistentas depresijas gadījumā, ja 3 iepriekšējie ārstēšanas kursi ar citiem antidepresantiem bijuši neveiksmīgi.

1	2	3	4	5	6
				Alprazolamum Clonazepamum Diazepamum Buspironum Fenazepamum Nitrazepamum Chlorprothixenum Haloperidolum Sulpiridum Trihexyphenidylum	
4.	Vidēji smaga garīga atpalcība	F71.0- F71.1 F71.8- F71.9	75	Melperonum Haloperidolum Chlorprothixenum	
	Smaga garīga atpalcība	F72.0-F72.1 F72.8-F72.9	75	Flupentixolum Zuclophenthixolum Amitriptylinum	
	Dziļa garīga atpalcība	F73.0-F73.1 F73.8-F73.9	75	Clomipraminum Nortriptylinum Diazepamum Fenazepamum Buspironum Nitrazepamum	
			50	Inkontinences līdzekļi	Tikai F72, F73 pacientiem līdz 18 gadu vecumam - līdz 3 gab. dienā.
5.	Neorganiska enurēze	F98.0	75		Bērniem līdz 18 g.v. Bērnu ķirurgu, bērnu neirologu, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas vai Daugavpils reģionālās slimnīcas funkcionālās diagnostikas kabineta speciālistu kompetencē.
				Desmopressinum	3 mēnešu ārstēšanas kursam pacientiem, kam neorganiskas enurēzes diagnoze apstiprināta, balstoties uz: 1) atkārtotu urīna analīžu, 2) vēdera dobuma ultrasonogrāfijas, 3) urofloumetrijas rezultātiem.
				Imipraminum Oxybutyninum	

Zāļu cenu valsts aģentūras direktore

D.Behmane