

Apstiprināts  
ar Zāļu cenu valsts aģentūras  
2006.gada 8. jūnija rīkojumu Nr.35

**Zāļu vispārīgie nosaukumi/ medicīnas ierīces, kas paredzēti diagnožu grupas  
"16. Faktori, kas ietekmē veselību un saskari ar veselības aprūpes darbiniekiem" ārstēšanai**

N.p.k.	Diagnozes grupa/ diagnoze	Diagnozes kods (SSK-10)	Komp. apmērs %	Zāļu vispārīgie nosaukumi/ medicīnas ierīces	Kompensācijas nosacījumi
1	2	3	4	5	6
1.	Mākslīgā atvere	Z93.1- Z93.6	100	Ileostomas maisiņi Kolostomas maisiņi Urostomas maisiņi Ileostomas, kolostomas, urostomas pamatnes (bāzes plates) Josta Ādu aizsargājoša pasta Adhezīvs pūderis Adhezīva ziede Plāksnītes adhezīva noņemšanai Plāksnītes aizsargkārtas veidošanai	15 maisiņi mēnesī 40 maisiņi mēnesī 20 maisiņi mēnesī Līdz 100 pamatnēm gadā 1 josta 6 mēnešos
2.	Transplantēta niere	Z94.0	100	Ciprofloxacinum Alfacalcidolum Colecalciferolum Calcitriolum Calcii acetatum Erythropoietinum Darbepoietinum alfa Prednisolonum Azathioprinum Ciclosporinum Ac.mycophenolicum Atorvastatinum Fluvastatinum Pravastatinum Simvastatinum Valganciclovirum Sirolimum	Izraksta tikai transplantologs vai nefrologs  Izraksta tikai transplantologs vai nefrologs: 1) pacientiem ar <i>Ciclosporinum</i> izraisītām toksiskām blaknēm, 2) pacientiem, kuriem sakarā ar dziļu neitropēniju nav iespējams pielietot purīnu sintēzes inhibitoru grupas preparātus, 3) pacientiem ar hronisku transplantāta disfunkciju.
3.	Aortokoronārās anastomozes transplantāts	Z95.1	100	Warfarinum	Tikai pie Z95.2.

1	2	3	4	5	6
	Protezēts sirds vārstulis	Z95.2	100	Clopidogrelum	Pēc veiktas perkutānas koronāras intervences (PCI- Z95.5): 1) ar zālēm pārklāta (pildīta) stenta implantāciju- 6 mēnešus, 2) neatliekamas, bez stenta implantāta- 6 mēnešus, 3) ar metāla stenta implantāciju- 2 mēnešus.
	Koronārs angioplastisks implantāts un transplantāts	Z95.5	100	Atorvastatinum Pravastatinum Rosuvastatinum Simvastatinum	Tikai pacientiem ar Z95.1 un Z95.5, kuriem kopējais holesterīns ir lielāks par 4,5 mmol/l vai zema blīvuma lipoproteīnu holesterīns ir lielāks par 2,5 mmol/l.
				Ezetimibum	Tikai pacientiem ar Z95.1 un Z95.5 kombinācijā ar statīna sākuma devu, ja netiek sasniegti lipīdu mērķi ar <i>Atorvastatinum</i> 20 mg vai <i>Pravastatinum</i> 40 mg, vai <i>Rosuvastatinum</i> 10 mg, vai <i>Simvastatinum</i> 40 mg.
				Fenofibratum Ciprofibratum	Tikai pacientiem ar Z95.1 un Z95.5, kuriem triglicerīdu līmenis ir lielāks par 4 mmol/l.

Zāļu cenu valsts aģentūras direktore

*D. Behmane*