

**Zāļu vispārīgie nosaukumi/medicīnas ierīces, kas paredzēti diagnožu grupas
"7. Elpošanas sistēmas slimības" ārstēšanai**

N.p.k.	Diagnozes grupa/ diagnoze	Diagnozes kods (SSK-10)	Komp. apmērs %	Zāļu vispārīgie nosaukumi/ medicīnas ierīces	Kompensācijas nosacījumi
1	2	3	4	5	6
1.	Akūts nazofaringīts (bērniem līdz 3 g.v.)	J00	50	Amoxicillinum	Pirmās izvēles līdzeklis
	Akūts faringīts (bērniem līdz 3 g.v.)	J02.0 J02.8 J02.9	50	Amoxicillinum/ Ac.clavulanicum	Tikai pacientiem, kuriem ir mikrobu rezistence pret amoksicilīnu
	Akūts laringīts un traheīts (bērniem līdz 3 g.v.)	J04.0- J04.2	50	Clarithromycinum	Tikai pacientiem ar alerģiju pret pirmās izvēles līdzekļiem
	Augšējo elpceļu infekcija ar multiplu un neprecizētu lokalizāciju (bērniem līdz 3 g.v.)	J06.0 J06.8 J06.9	50	Cefuroximum Cefprozilum	Tikai pacientiem ar alerģiju pret citām antibiotikām vai mikrobu rezistences gadījumā
	Gripa, ja vīruss nav identificēts (bērniem līdz 3 g.v.)	J11.0 J11.1 J11.8	50		
	Streptococcus pneumoniae ierosināta pneimonija (bērniem līdz 3 g.v.)	J13	50		
	Citur neklasificēta bakteriāla pneimonija (bērniem līdz 3 g.v.)	J15.0- J15.9	50		
	Citu mikroorganismu ierosināta, citur neklasificēta pneimonija (bērniem līdz 3 g.v.)	J16.0 J16.8	50		
	Neprecizēta mikroorganisma ierosināta pneimonija (bērniem līdz 3 g.v.)	J18.0- J18.2, J18.8 J18.9	50		
	Akūts bronhīts (bērniem līdz 3 g.v.)	J20.0- J20.9	50		
2.	Cita hroniska obstruktīva plaušu slimība	J44.0 J44.1 J44.8 J44.9	75	Fenoterolum Fenoterolum/ Ipratropium Salbutamolum Salbutamolum/ Ipratropium Theophyllinum	
		Salmeterolum Formoterolum Tiotropium		Tikai smagas un ļoti smagas formas gadījumā (FEV1 < 50% no normatīvajiem rādītājiem).	
		Beclometasonum Budesonidum Fluticasonum Budesonidum/ Formoterolum Salmeterolum/ Fluticasonum		Tikai smagas un ļoti smagas formas gadījumā (FEV1 < 50% no normatīvajiem rādītājiem) pie biežiem uzliesmojumiem, kuru ārstēšanai nepieciešami perorāli vai parenterāli lietojamie glikokortikoīdi un/vai antibakteriālie līdzekļi.	

1	2	3	4	5	6
				Triamcinolonum Prednisolonum Methylprednisolonum Amoxicillinum Sulfamethoxazolom/ Trimetoprimum Doxycyclinum Ciprofloxacinum Clarithromycinum Cefuroximum Cefprozilum	Tikai smagas un ļoti smagas formas gadījumā (FEV1 < 50% no normatīvajiem rādītājiem) pie slimības uzliesmojuma.
			50	Krājtelas medikamentu inhalācijām	1 krājtelpa gadā.
3.	Astma Pārsvarā alerģiska astma Nealerģiska astma Jaukta tipa astma Neprecizēta astma	J45.0 J45.1 J45.8 J45.9	75 75 75 75	Fenoterolum Salbutamolom Fenoterolum/ Ipratropium Salbutamolom/ Ipratropium Theophyllinum Beclometasonum Budesonidum Fluticasonum Triamcinolonum Prednisolonum Methylprednisolonum Montelukastum	 Pulverinhalatori – tikai pacientiem, kuriem ar <i>Beclometasonum</i> un <i>Budesonidum</i> gāzu aerosolu lietošanu atbilstošās devās netiek nodrošināta astmas kontrole. Tikai pacientiem ar vidēji smagu un smagu persistējošu astmu, kuriem ar <i>Beclometasonum</i> un <i>Budesonidum</i> netiek nodrošināta astmas kontrole. Tikai bērniem līdz 5 gadu vecumam vieglas, vidēji smagas un smagas persistējošas astmas gadījumā. Pieaugušiem un bērniem, kuri vecāki par 5 gadiem, vidēji smagas un smagas persistējošas astmas gadījumā (ja inhalējamo glikokortikoīdu terapijas rezultātā netiek nodrošināta sekmīga astmas kontrole) : 1) ar apstiprinātu J45.0 "Pārsvarā alerģiska astma" ("Atopiska astma", "Eksogēna astma"), 2) ar fiziskas slodzes astmu, 3) ar "Aspirīna astmu". Smagas persistējošas bronhiālās astmas gadījumā- ftiziopeimonologa kompetencē.

1	2	3	4	5	6
				Formoterolum Salmeterolum Budesonidum/ Formoterolum Salmeterolum/ Fluticasonum	Tikai pacientiem ar vidēji smagu persistējošu un smagu persistējošu bronhiālo astmu
			50	Krājtelas medikamentu inhalācijām	
4.	Bronhektāzes	J47	50	Salbutamolom Fenoterolum Salbutamolom/ Ipratropium Fenoterolum/ Ipratropium Theophyllinum	Diagnoze jāapstiprina ftizio pneimologam.
				Amoxicillinum Amoxicillinum/ Ac.clavulanicum Doxycyclinum Sulfamethoxazolom/ Trimethoprimum Ciprofloxacinum Cefuroximum Cefprozilom Clarithromycinum	Pie slimības uzliesmojuma bronhopulmonālās infekcijas gadījumā.
				Krājtelas medikamentu inhalācijām	1 krājtelpa gadā
5.	Hipersensitivitātes pneimonīts, ko izraisījuši organiski putekļi	J67.0- J67.9	75	Prednisolonum Triamcinolonum Methylprednisolonum	Diagnoze jāapstiprina ftizio pneimologam
6.	Citas intersticiālas plaušu slimības	J84.0 J84.1 J84.8 J84.9	75	Prednisolonum Triamcinolonum Methylprednisolonum Azathioprinum Methotrexatum	Diagnoze jāapstiprina ftizio pneimologam
7.	Elpošanas orgānu bojājums citur klasificētu slimību dēļ	J99.0 J99.1 J99.8	75	Prednisolonum Triamcinolonum Methylprednisolonum Azathioprinum Methotrexatum	Diagnoze jāapstiprina ftizio pneimologam

Direktore

D. Behmane

I. Mauriņa 7876127

A. Fogeļe 7876132