

3.pielikums  
Ministru kabineta  
2009.gada 6.janvāra  
noteikumiem Nr.10

VALSTS STATISTIKAS PĀRSKATS

**PĀRSKATS PAR SASLIMSTĪBU AR VISU FORMU AKTĪVU  
TUBERKULOZI UN TUBERKULOZES SLIMNIEKIEM  
\_\_\_\_.gadā**

### 1. Pirmreizējo tuberkulozes slimnieku sadalījums pēc dzimuma un vecuma

Novērošanas grupas	SSK-10 kods <sup>1</sup>	Dzimums	Rindas Nr.	Slimnieku skaits, kam pirmreizēji uzstādīta diagnoze												
				Kopā	tajā skaitā pa vecuma grupām (gados)											
					0-4 (ieskaitot)	5-9 (ieskaitot)	10-14 (ieskaitot)	15-17 (ieskaitot)	18-24 (ieskaitot)	25-34 (ieskaitot)	35-44 (ieskaitot)	45-54 (ieskaitot)	55-60 (ieskaitot)	61-64 (ieskaitot)	65 un vecāki	
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Elpošanas orgānu tuberkuloze</b>	A15-A16	vīr.	1													
		siev.	2													
		no tiem TM <sup>2</sup> pozitīvs skopiski	vīr.	3												
		siev.	4													
		no tiem TM pozitīvs uzsējumā	vīr.	5												
		siev.	6													
<i>tajā skaitā</i> plaušu tuberkuloze	A15.0-A15.3 A15.5-A15.7 A16.0-A16.2 A16.4-A16.7	vīr.	7													
		siev.	8													
		no tiem TM pozitīvs skopiski	vīr.	9												
		siev.	10													
		no tiem TM pozitīvs uzsējumā	vīr.	11												
		siev.	12													
<b>Pārējo orgānu un sistēmu tuberkuloze</b>	A17-A19	vīr.	13													
		siev.	14													
		no tiem TM pozitīvs uzsējumā	vīr.	15												
		siev.	16													
smadzeņu apvalku un CNS <sup>3</sup> tuberkuloze	A17	vīr.	17													
		siev.	18													
kaulu un locītavu sistēmas tuberkuloze	A18.0	vīr.	19													
		siev.	20													
uroģenitālās sistēmas tuberkuloze	A18.1	vīr.	21													
		siev.	22													
acu tuberkuloze	A18.5	vīr.	23													
		siev.	24													
perifēro limfas mezglu tuberkuloze	A18.2	vīr.	25													
		siev.	26													
ādas un zemādas audu tuberkuloze	A18.4	vīr.	27													
		siev.	28													

Novērošanas grupas	SSK–10 kods <sup>1</sup>	Dzimums	Rindas Nr.	Slimnieku skaits, kam pirmreizēji uzstādīta diagnoze											
				Kopā	tajā skaitā pa vecuma grupām (gados)										
					0–4 (ieskaitot)	5–9 (ieskaitot)	10–14 (ieskaitot)	15–17 (ieskaitot)	18–24 (ieskaitot)	25–34 (ieskaitot)	35–44 (ieskaitot)	45–54 (ieskaitot)	55–60 (ieskaitot)	61–64 (ieskaitot)	65 un vecāki
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
miliāra (ģeneralizēta) tuberkuloze	A19	vīr.	29												
		siev.	30												
pārējos orgānos un sistēmās	A18.3 A18.6–A18.8	vīr.	31												
		siev.	32												
<b>Visu formu tuberkuloze kopā</b>	A15–A19	vīr.	33												
		siev.	34												
no tiem TM pozitīvs skopiski		vīr.	35												
		siev.	36												
no tiem TM pozitīvs uzsējumā		vīr.	37												
		siev.	38												

## 2. Iestādes uzskaitē esošie slimnieki

Novērošanas grupas	SSK–10 kods <sup>1</sup>	Rindas Nr.	Gada laikā ņemti uzskaitē						Ir uzskaitē pārskata gada beigās		
			pirmreizēji saslimušie			recidīvi			pieaugušie (18 gadi un vecāki)	pusaudži (15–17 gadi ieskaitot)	bēmi (0–14 gadi ieskaitot)
			pieaugušie (18 gadi un vecāki)	pusaudži (15–17 gadi ieskaitot)	bēmi (0–14 gadi ieskaitot)	pieaugušie (18 gadi un vecāki)	pusaudži (15–17 gadi ieskaitot)	bēmi (0–14 gadi ieskaitot)			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Elpošanas orgānu tuberkuloze kopā</b>	A15–A16	1									
no tiem TM pozitīvs skopiski		2									
no tiem TM pozitīvs uzsējumā		3									
<i>tajā skaitā</i> plaušu tuberkuloze	A15.0–A15.3	4									
no tiem TM pozitīvs skopiski	A16.0–A16.2	5									

Novērošanas grupas	SSK-10 kods <sup>1</sup>	Rindas Nr.	Gada laikā ņemti uzskaitē						Ir uzskaitē pārskata gada beigās		
			pirmreizēji saslimušie			recidīvi			pieaugušie (18 gadi un vecāki)	pusaudži (15-17 gadi ieskaitot)	bērni (0-14 gadi ieskaitot)
			pieaugušie (18 gadi un vecāki)	pusaudži (15-17 gadi ieskaitot)	bērni (0-14 gadi ieskaitot)	pieaugušie (18 gadi un vecāki)	pusaudži (15-17 gadi ieskaitot)	bērni (0-14 gadi ieskaitot)			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
no tiem TM pozitīvs uzņēmā		6									
tuberkulozes primārkomplekss	A15.7, A16.7	7									
intratorakālo limfmezglu tuberkuloze	A15.4, A16.3	8									
tuberkulozi pleirīti, empiema	A15.6, A16.5	9									
trahejas, bronhu, augšējo elpošanas ceļu (deguna, mutes dobuma, rīkles) tuberkuloze	A15.5, A16.4	10									
<b>Pārējo orgānu un sistēmu tuberkuloze kopā</b>	A17-A19	11									
no tiem TM pozitīvs		12									
smadzeņu apvalku un CNS tuberkuloze	A17	13									
kaulu un locītavu tuberkuloze	A18.0	14									
uroģenitālās sistēmas tuberkuloze	A18.1	15									
ādas un zemādas audu tuberkuloze	A18.4	16									
perifēro limfas mezglu tuberkuloze	A18.2	17									
acu tuberkuloze	A18.5	18									
miliārā (ģeneralizētā) tuberkuloze	A19	19									
pārējos orgānos un sistēmās	A18.3, A18.6-A18.8	20									
<b>Aktīvās tuberkulozes formas kopā</b>	A15-A19	21									
no tiem TM pozitīvs		22									
hroniski noritošas grupas		23									
AMR <sup>4</sup>		24									
Kontakta personas (bērni un pusaudži)	Z20.1	25									

### 3. Tuberkulozes slimnieku kontingenta sadalījums pēc dzimuma un vecuma

Novērošanas grupas	SSK-10 kods <sup>1</sup>	Dzimums	Rindas Nr.	Slimnieku skaits pārskata gada beigās											
				Kopā	tajā skaitā pa vecuma grupām (gados)										
					0-4 (ieskaitot)	5-9 (ieskaitot)	10-14 (ieskaitot)	15-17 (ieskaitot)	18-24 (ieskaitot)	25-34 (ieskaitot)	35-44 (ieskaitot)	45-54 (ieskaitot)	55-60 (ieskaitot)	61-64 (ieskaitot)	65 un vecāki
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Elpošanas orgānu tuberkuloze</b>	A15-A16	vīr.	1												
		siev.	2												
no tiem TM pozitīvs skopiski		vīr.	3												
		siev.	4												
no tiem TM pozitīvs uzsējumā		vīr.	5												
		siev.	6												
<i>tajā skaitā</i> plaušu tuberkuloze	A15.0-A15.3 A15.5-A15.7 A16.0-A16.2 A16.4-A16.7	vīr.	7												
		siev.	8												
no tiem TM pozitīvs skopiski		vīr.	9												
		siev.	10												
no tiem TM pozitīvs uzsējumā		vīr.	11												
		siev.	12												
<b>Pārējo orgānu un sistēmu tuberkuloze</b>	A17-19	vīr.	13												
		siev.	14												
no tiem TM pozitīvs skopiski		vīr.	15												
		siev.	16												
no tiem TM pozitīvs uzsējumā		vīr.	17												
		siev.	18												
smadzeņu apvalku un CNS tuberkuloze	A17	vīr.	19												
	siev.	20													
kaulu un locītavu sistēmas tuberkuloze	A18.0	vīr.	21												
	siev.	22													
uroģenitālās sistēmas tuberkuloze	A18.1	vīr.	23												
	siev.	24													
acu tuberkuloze	A18.5	vīr.	25												
	siev.	26													
perifēro limfas mezglu tuberkuloze	A18.2	vīr.	27												
	siev.	28													

Novērošanas grupas	SSK-10 kods <sup>1</sup>	Dzimums	Rindas Nr.	Slimnieku skaits pārskata gada beigās											
				Kopā	tajā skaitā pa vecuma grupām (gados)										
					0-4 (ieskaitot)	5-9 (ieskaitot)	10-14 (ieskaitot)	15-17 (ieskaitot)	18-24 (ieskaitot)	25-34 (ieskaitot)	35-44 (ieskaitot)	45-54 (ieskaitot)	55-60 (ieskaitot)	61-64 (ieskaitot)	65 un vecāki
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ādas un zemādas audu tuberkuloze	A18.4	vīr.	29												
		siev.	30												
miliāra (ģeneralizēta) tuberkuloze	A19	vīr.	31												
		siev.	32												
pārējos orgānos un sistēmās	A18.3	vīr.	33												
	A18.6-A18.8	siev.	34												
<b>Visu formu tuberkuloze kopā</b>		vīr.	35												
		siev.	36												
no tiem TM pozitīvs skopiski	A15-A19	vīr.	37												
		siev.	38												
no tiem TM pozitīvs uzsējumā		vīr.	39												
		siev.	40												

#### 4. Kohorta analīze

	Rindas Nr.	AP <sup>5</sup>				AR <sup>6</sup>				Atkārtots kurss		
		TM pozitīvs skopiski	TM pozitīvs uzsējumā	Kopā	TM negatīvs	TM pozitīvs skopiski	TM pozitīvs uzsējumā	Kopā	TM negatīvs	TM pozitīvs skopiski	TM pozitīvs uzsējumā	Kopā
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izārstēts	1											
Ārstēšana pabeigta	2											
Abacilēts pēc 2-3 mēn.	3											
Neveiksme <sup>7</sup>	4											
Pārtraucis ārstēšanu	5											
Maina dzīvesvietu ārstēšanās laikā	6											
Miris	7											
AMR	8											
KOPĀ	9											

**5. Miruši no tuberkulozes un reģistrētie miršanas gadījumi cilvēkiem, kas nebija iestādes uzskaitē**

	Rindas Nr.	Pieaugušie (18 gadi un vecāki)	Pusaudži (15–17 gadiem ieskaitot)	Bērni (0–14 gadiem ieskaitot)
A	B	1	2	3
<b>Miruši no aktīvas tuberkulozes</b>	1			
t.sk. 1.saslimšanas gadā	2			
t.sk. AMR	3			
<b>Miruši no tuberkulozes sekām</b>	4			
<b>Tuberkuloze pirmo reizi diagnosticēta tikai sekcijā</b>	5			
t.sk. aktīva tuberkuloze	6			
tuberkulozes sekas	7			
<b>Tuberkuloze kā nāves iemesls noteikta cilvēkam, kas slimojis ar tuberkulozi, bet nebija dienesta novērošanā</b>	8			

<sup>1</sup> SSK–10 kods – Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).

<sup>2</sup> TM – tuberkulozes nūjiņa (*Mycobacterium tuberculosis*).

<sup>3</sup> CNS – centrālā nervu sistēma.

<sup>4</sup> AMR – aktīva multirezistenta tuberkuloze.

<sup>5</sup> AP – aktīvs pirmreizējs.

<sup>6</sup> AR – aktīvs recidīvs.

<sup>7</sup> Izdala tuberkulozes nūjiņu pēc 5 mēnešu ārstēšanās.

Veidlapas aizpildīšanas datums (dd.mm.gggg.)   .   .    .

Iestādes vadītājs \_\_\_\_\_  
(paraksts un tā atšifrējums)

Veidlapas aizpildītājs \_\_\_\_\_ Tālrunis \_\_\_\_\_  
(paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministrs

I.Eglītis